

Skuteczne metody i mierzalne efekty „ratowania” młodych bielików, które wypadają z gniazd

Dariusz Anderwald

Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie

Bielik to gatunek, który w ostatnich 25 latach dynamicznie zwiększył swoją liczebność. Ocenia się, że w Polsce występuje obecnie 1400-1600 par lęgowych, co oznacza, że w większości nadleśnictw w Polsce występują gniazda tego gatunku. Każdego roku lokalizowanych jest kilkadziesiąt nowych gniazd, coraz częściej w suboptymalnych siedliskach, np. na coraz młodszych drzewach lub w otwartym krajobrazie rolniczym. Niestety wiele takich gniazd jest narażonych na spadanie pod wpływem wiatru, zwłaszcza pod koniec czerwca i na początku lipca, kiedy młode bieliki trenują skrzydła. Wywiane z gniazd zwykle przemoczone na skutek deszczu młode nie potrafią jeszcze samodzielnie latać. Najczęściej są wtedy natychmiast zabierane spod gniazd i oddawane do ośrodków rehabilitacji ptaków, mimo obecności ptaków dorosłych. Nie zawsze jednak jest to zasadne, co zależy głównie od stopnia rozwoju piskląt. W prezentacji zostanie przedstawionych kilka odrębnych metod „ratowania” takich młodych.